

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **6853** /BYT-BM-TE
v/v xác minh và báo cáo sự cố
y khoa tại Bệnh viện Phụ nữ
Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày **20** tháng 11 năm 2019

KHẨN

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng

Ngày 20/11/2019, Báo điện tử laodong.vn có đăng bài phản ánh trường hợp sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng ngày 17/11/2019. Theo thông tin Báo đăng, ngày 17/11/2019 Bệnh viện Phụ nữ thực hiện mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống cho sản phụ V.T.N.S và sản phụ N.T.H, sau đó sản phụ S đã tử vong cùng ngày; sản phụ H thì trong tình trạng rất nguy kịch (*có thai lần 3*). Để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đề nghị Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng:

1. Kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung Báo đăng và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện Phụ nữ đối với sản phụ S và sản phụ H về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em), đồng thời gửi email theo địa chỉ ngocdth.bmte@moh.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ;

2. Chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, nhân lực hỗ trợ và chăm sóc điều trị tốt nhất cho sản phụ H;

3. Yêu cầu Bệnh viện Phụ nữ thành lập hội đồng chuyên môn (*nếu Bệnh viện Phụ nữ không đủ điều kiện, thì Sở Y tế thành lập hội đồng chuyên môn*) theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ V.T.N.S và sản phụ N.T.H; Thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình các sản phụ và cơ quan truyền thông đại chúng;

4. Xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

5. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ sản phụ khoa và sơ sinh nghiêm túc thực hiện công văn số 5069/BYT-BM-TE ngày 29/8/2019 về sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai;

6. Trường hợp có nghi ngờ liên quan đến thuốc sử dụng trong quá trình điều trị cho các sản phụ, cần chỉ đạo đơn vị lập báo cáo phản ứng có hại của thuốc theo hướng dẫn tại Quyết định số 1088/QĐ-BYT, ngày 04/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Y

tế, khẩn trương gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia (đồng gửi Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Vụ Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em, Bộ Y tế);

7. Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

Xin trân trọng cảm ơn 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Cục QLKCB (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Vụ TT-TĐ khen thưởng (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 08).

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Đinh Anh Tuấn

<https://laodong.vn/y-te/2-san-phu-tai-bien-sau-mo-lay-thai-da-nang-kiem-tra-thuoc-gay-te-767150.ldo>

2 sản phụ tai biến sau mổ lấy thai, Đà Nẵng kiểm tra thuốc gây tê

LĐO | 20/11/2019 | 09:44

Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, một sản phụ đã tử vong và một sản phụ khác rơi vào tình trạng nguy kịch sau ca mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.

Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết, qua xem xét các quy trình về khám chữa bệnh, đơn vị đã đặt nghi vấn đối với loại thuốc gây tê nên đã niêm phong lấy mẫu gửi ra Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Dự kiến kết quả có trong 7-10 ngày tới.

Trước đó, ngày 17.11, Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng tiếp nhận hai sản phụ. Cụ thể, sản phụ V.T.N.S (33 tuổi, trú quận Cẩm Lệ), mang thai 38 tuần 3 ngày trong trạng thái chuyển dạ, thai to, đa ối.

Đến 11h20 phút cùng ngày, các bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống, mổ lấy thai nhi với sản phụ S. Tuy nhiên, đến cuối ca mổ, bệnh nhân có biểu hiện đuối thở 2 chi dưới từng cơn, mạch tăng nhanh nên được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến khoảng 20h cùng ngày, sản phụ tử vong.

Trường hợp thứ hai là sản phụ N.T.H (33 tuổi, trú quận Liên Chiểu), mang thai 37 tuần 1 ngày, nhập viện lúc 10h50 trong tình trạng chuyển dạ. Đến 15h ngày 17.11, sản phụ được đưa vào phòng mổ.

Sau khi gây tê tủy sống, bệnh nhân có các triệu chứng giống sản phụ S như biểu hiện tê, đau vùng mông, khó chịu, bứt rứt nên các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại đây, sau khi mổ lấy cháu bé ra ngoài, sản phụ H được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, 2 trẻ sơ sinh của 2 sản phụ đều hoàn toàn khỏe mạnh. Riêng sản phụ H, diễn biến bệnh tình có tiến triển nhưng chưa qua khỏi tình trạng nguy hiểm.

Về phía Sở Y tế Đà Nẵng, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, có mời các chuyên gia gây mê Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm nghiệm cùng các phòng chức năng của sở đến làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

THUY TRANG

<https://nld.com.vn/suc-khoe/vu-2-san-phu-tu-vong-1-nguy-kich-niem-phong-phong-mo-benh-vien-phu-nu-da-nang-20191120142400294.htm>

Vụ 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch: Niêm phong phòng mổ Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

20-11-2019 - 02:33 PM | Sức khỏe

(NLDO) – Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại thuốc gây tê tủy sống nghi là nguyên nhân gây ra vụ 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch ở Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng.

Ngày 20-11, Bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc TP Đà Nẵng đã chủ trì buổi trả lời báo chí về vụ việc 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch xảy ra khi đang tiến hành mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ nữ.

Bác sĩ Út cho biết sở đã chỉ đạo Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng đã niêm phong phòng mổ, tạm ngưng phẫu thuật tại bệnh viện từ tối 17-11. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế trong ngày 18-11 đã có mặt tại Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng để kiểm tra đồng thời niêm phong toàn bộ lô thuốc gây tê tủy sống và thuốc gây mê NKQ tại khoa gây mê hồi sức.

Theo bác sĩ Út, tới thời điểm hiện tại, Sở Y tế ghi nhận 3 ca tai biến sản khoa khi mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ nữ TP. Trong đó, 1 ca sản phụ tử vong vào ngày 22-10. Hai ca tai biến cùng ngày 17-11 cũng tại bệnh viện này trong đó có 1 ca tử vong và 1 ca nguy kịch hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. May mắn là cả 3 trẻ sơ sinh trên đều được cứu sống và ổn định sức khỏe.

Bác sĩ Út cho biết, cả 3 ca sản phụ trên đều được Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng tiếp nhận đúng quy trình và có chỉ đạo mổ. Loại thuốc gây tê sử dụng cho cả 3 trường hợp này là Bupivacaine WPW do Ba Lan sản xuất. Ông Út cho biết, trước đây, Sở Y tế TP Đà Nẵng có tổ chức đấu thầu thuốc gây tê trên và đơn vị trúng thầu cung ứng loại thuốc Marcain do Pháp sản xuất để sử dụng rộng rãi cho các đơn vị y tế trên địa bàn.

Bác sĩ Võ Xuân Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ cho biết thêm, bệnh viện được phân bổ 850 ống thuốc gây tê Marcain để sử dụng từ 2018 tuy nhiên đến 5-2019, nhà cung cấp thông báo hết hàng cung ứng. "Để có thuốc sử dụng, bệnh viện đã tìm nguồn hàng thay thế. Khi đó chỉ có Bupivacaine của Ba Lan sản xuất do nhà cung cấp Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 – Chi nhánh Đà Nẵng" – ông Phúc cho biết.

Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng đã nhập tổng cộng 380 ống thuốc Bupivacaine của Ba Lan kể từ 5-2019 chia làm 3 đợt nhập trong đó có 1 đợt từ tháng 5 gồm 130 ống đã sử dụng hết và không có biến chứng. Đợt 2 và đợt 3 nhập 250 ống vào 10-2019, đã dùng hết 130 ống và có 3 vụ tai biến như nói trên.

Bác sĩ Nguyễn Út cho hay theo quy định của Bộ Y tế, loại thuốc gây tê trên nằm trong danh mục chi trả bảo hiểm nên khi nhà cung ứng hết hàng, bệnh viện có thể áp thầu sang thuốc khác đã được Cục quản lý dược cho phép. Cụ thể, trong trường hợp trên, khi hết nhà cung ứng hết thuốc do Sở Y tế TP Đà Nẵng đầu thầu, Bệnh viện Phụ nữ đã áp thầu theo gói mà Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi trúng thầu với loại thuốc Bupivacaine của Ba Lan và nhập về để sử dụng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết thêm ngoài Bệnh viện Phụ nữ, trên địa bàn còn có 2 cơ sở y tế khác sử dụng loại thuốc gây tê trên gồm Bệnh viện Phụ sản Nhi TP Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Hiện tại, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát đồng thời ngưng sử dụng loại thuốc gây tê trên để chờ kết quả xét nghiệm từ Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Ông Út cho biết thêm ngoài Đà Nẵng, các địa phương ở miền Nam như Bến Tre, Cần Thơ gần đây đã ghi nhận trường hợp biến chứng sản khoa tương tự và cùng sử dụng loại thuốc gây tê như trên.

Ông Ngô Minh Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết tính tới thời điểm hiện tại sở chưa nhận được công văn chính thức nào từ Bộ Y tế hay Cục quản lý dược để khuyến cáo về lô thuốc trên. Ông Nguyễn Út cho hay, loại thuốc Bupivacaine trên được Cục quản lý dược cấp phép lưu hành nên vấn đề xử lý thuộc thẩm quyền của Cục.

Cụ thể, ngày 17-11, bệnh nhân V.T.N.S (SN 1987, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhập Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng để chờ sinh khi thai kỳ được 38 tuần 3 ngày. Bác sĩ chỉ định mổ lấy thai do sản phụ S. có dấu hiệu chuyển dạ, thai to và đa ối.

Trưa cùng ngày, khi ê kíp mổ tiến hành gây tê tủy sống để thực hiện mổ lấy thai. Cuối ca mổ thì bệnh nhân có biểu hiện đuối thẳng 2 chi dưới từng cơn, mạch tăng nhanh. Lập tức, ê kíp đã chuyển thai phụ sang Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để cấp cứu. Tuy nhiên, đến hơn 20 giờ cùng ngày, sản phụ này tử vong.

Cùng trong ngày 17-11, chị N.T.H (SN 1987, trú quận Liên Chiểu) nhập viện vào lúc 10 giờ 50 phút khi đang mang thai 37 tuần 1 ngày trong tình trạng chuyển dạ vết mổ cũ. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng mổ để gây tê tủy sống. Sau đó, sản phụ H. có biểu hiện tương tự sản phụ S. nên các bác sĩ đã chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bệnh viện đã tiến hành mổ lấy thai thành công rồi chuyển sản phụ H. vào khoa hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 22-10, một sản phụ khác là L.H.P.T (SN 1987, trú quận Hải Châu) nhập viện và tiến hành mổ lấy thai. Chị T sau đó cũng bị tử vong với các triệu chứng tương tự như trên.

<https://laodong.vn/y-te/2-san-phu-tai-bien-sau-mo-lay-thai-da-nang-kiem-tra-thuoc-gay-te-767150.lldo>

2 sản phụ tai biến sau mổ lấy thai, Đà Nẵng kiểm tra thuốc gây tê
LĐO | 20/11/2019 | 09:44

Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, một sản phụ đã tử vong và một sản phụ khác rơi vào tình trạng nguy kịch sau ca mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.

Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết, qua xem xét các quy trình về khám chữa bệnh, đơn vị đã đặt nghi vấn đối với loại thuốc gây tê nên đã niêm phong lấy mẫu gửi ra Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Dự kiến kết quả có trong 7-10 ngày tới.

Trước đó, ngày 17.11, Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng tiếp nhận hai sản phụ. Cụ thể, sản phụ V.T.N.S (33 tuổi, trú quận Cẩm Lệ), mang thai 38 tuần 3 ngày trong trạng thái chuyển dạ, thai to, đa ối.

Đến 11h20 phút cùng ngày, các bác sĩ tiến hành gây tê tùy sống, mổ lấy thai nhi với sản phụ S. Tuy nhiên, đến cuối ca mổ, bệnh nhân có biểu hiện đuối thẳng 2 chi dưới từng cơn, mạch tăng nhanh nên được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến khoảng 20h cùng ngày, sản phụ tử vong.

Trường hợp thứ hai là sản phụ N.T.H (33 tuổi, trú quận Liên Chiểu), mang thai 37 tuần 1 ngày, nhập viện lúc 10h50 trong tình trạng chuyển dạ. Đến 15h ngày 17.11, sản phụ được đưa vào phòng mổ.

Sau khi gây tê tùy sống, bệnh nhân có các triệu chứng giống sản phụ S như biểu hiện tê, đau vùng mông, khó chịu, bứt rứt nên các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại đây, sau khi mổ lấy cháu bé ra ngoài, sản phụ H được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, 2 trẻ sơ sinh của 2 sản phụ đều hoàn toàn khỏe mạnh. Riêng sản phụ H, diễn biến bệnh tình có tiến triển nhưng chưa qua khỏi tình trạng nguy hiểm.

Về phía Sở Y tế Đà Nẵng, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, có mời các chuyên gia gây mê Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm nghiệm cùng các phòng chức năng của sở đến làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

THUYỀN TRANG